

คำแนะนำเพิ่มเติมในการป้องกันเพลี้ยแป้ง



1. ในแปลงที่เคยมีการระบาดของ กระจงครด ควรไถตากดินทิ้งไว้อย่างน้อย 15 วัน



2. กองต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้ปลูก หากจำเป็น ต้องเก็บรักษาไว้ ควรใช้โทอะมีโทแอสเม ชนิดผงขนาด 2 กรัม+น้ำ 20 ลิตร ผสมไวท์ออยล์ หรือน้ำยาจับใบ ฟันให้ทั่ว กองต้นพันธุ์ที่จะเก็บรักษา โดยจะต้อง ขยาย หรือลั่นกองลงก่อนฉีดจากนั้น ตั้งกองต้นพันธุ์เก็บรักษาไว้รอปลูกต่อไป



4. คำแนะนำในข้อ 3 ให้ใช้เฉพาะการ ระบาดเล็กน้อยเท่านั้น หากระบาดรุนแรง ควรไถทิ้ง พักดินไว้ 15 วัน ก่อนจะปลูกมัน ต่อเนื่อง

3. หมั่นตรวจแปลงปลูก ทุก 10 วัน หาก พบเพลี้ยแป้งระบาดเล็กน้อยให้ทำลายทันที โดย

3.1 มันอายุ ไม่เกิน 4 เดือน ถอนทั้งต้น ใส่ถุงดำไปทำลายทิ้ง และเผ่าะวังต่อเนื่อง บริเวณนั้นอย่างใกล้ชิด

3.2 มันอายุ 5-7 เดือน หากพบให้เด็ด ยอด ใส่ถุงดำไปทำลายเช่นเดียวกัน

*** ทั้ง 2 วิธีการ จะต้องทำด้วยความ ระมัดระวัง ไม่ให้เพลี้ยแป้งร่วงลงดิน หรือหล่นกระจายในแปลง

“ถ้ามันแช่ก่อนพันธุ์ รอในฝั่งรถ
ถ้ามันไม่แช่ก่อน ไม่แช่ก่อนพันธุ์ มันจะชดง
อย่างประมาณลูกหลานอึ้ง”

หุดองพ่อคุณ มีรังไร้อ

ฮ่า ๆๆ แช่แล้ว
รวบ..รวบ..รวบ
ได้ผลจริงๆ..

ไม่แช่ก่อนพันธุ์
เลยช่วย..!
โดนเพลี้ยกินหมด



แช่ก่อนพันธุ์ ปลูกมันๆ รวบแน่
ค่าสารเคมี ไร่ละ 20 บาท เท่านั้น..!

พลิกดูรายละเอียด สูตรวิธีแช่ได้เดี๋ยวนี้

● ใช้สารโทอะมีโทแชนชนิดผง 25%WP 10 กรัม + น้ำ 50 ลิตร + แขนาน 10 นาที

● ใช้สารโทอะมีโทแชนชนิดน้ำ 350 FS 10 ซี.ซี. + น้ำ 80 ลิตร + แขนาน 15 นาที

1. ใช้ถังผสมปูน 2 ถัง ใส่น้ำถังละ 80 ลิตร ผสมสารเคมีถังละ 10 ซี.ซี.
2. ใช้ตาข่ายเขี่ยรองกันถัง
3. ใส่່อนพันธุ์ถังละ 500 ่อน ลงในแต่ละถัง รวม 1,000 ่อน
4. แขนาน 15 นาที ยกตาข่ายเขี่ยขึ้น เทให้่อนพันธุ์สะเด็ดน้ำ นำไปปลูกได้
5. ระยะเวลา 15-20 นาที จะแช่ได้ 1,000 ่อน
6. เพื่อความสะดวกควรแช่่อนพันธุ์ในช่วงเวลาเย็น และนำไปปลูกช่วงเช้า

● ต้นทุนค่าสารเคมี แ่ 12 ไร่ - ชนิดน้ำ 10 ซี.ซี. = 140 บาท x 2 ถัง = /280 บาท