

การระบาดของเพลิงไหม้ 2552/53

1. เดิม สถานการณ์การระบาดในช่วงเดือน เมษายน 52 รวม 1.2 ล้านไร่
2. ในเดือนปลายมิถุนายน 52 พื้นที่ระบาดลดลงเหลือ 500,000 ไร่เนื่องจาก
 - ทุกฝ่าย ร่วมรณรงค์ป้องกันและกำจัด
 - มั่นสำปะหลัง ส่วนใหญ่ที่ครบอายุ ได้เก็บเกี่ยวแล้ว
 - มีฝนตกต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 52 ทำให้การระบาดของเพลิงไหม้ลดลง

การระบาดรอบใหม่

1. ในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 52 เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้เพลี้ยแป้งระบาดในรอบที่สอง พื้นที่ระบาดส่วนใหญ่ เป็นมันสำปะหลังที่ปลูกใหม่ อายุ 4-6 เดือน
2. จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ระบาดรุนแรงหลายอำเภอ เช่น ครบุรี เสิงสาง หนองบุญมาก สีคิ้ว ด้านขุนทด

สรุปพื้นที่ระบาค ณ.30 กันยายน 52 รายงานโดยส่งเสริมการเกษตร

ภาค	จังหวัด	พื้นที่ปลูก(ไร่)	เล็กน้อย	รุนแรง	รวม(ไร่)
ตะวันออก เฉียงเหนือ	1. นครราชสีมา	1,985,000	164,992	33,646	198,638
	2. บุรีรัมย์	274,053	1,384	36,612	37,996
	3. ชัยภูมิ	399,012	-	1,201	1,201
ตะวันออก	1. สระแก้ว	455,042	4,900	-	4,900
	2. จันทบุรี	262,236	17,717	-	17,717
	3. ระยอง	50,158	130	-	130
	4. ปราจีนบุรี	220,223	3,374	-	3,374
กลาง	1. ลพบุรี	393,727	1,000	500	1,500
	2. อุทัยธานี	61,095	-	4,617	4,617
	3. กาญจนบุรี	600,415	39,938	135,633	175,571
	4. สระบุรี	31,681	6,805	-	6,805
เหนือ ตอนล่าง	1. กำแพงเพชร	260,918	2,552	-	2,552
	2. พิษณุโลก	74,683	5,000	-	5,000
	3. นครสวรรค์	102,019	-	20,000	20,000
รวม	14 จังหวัด	5,143,262	247,792	232,209	480,001 (9.3%)

หมายเหตุ ระบาคเล็กน้อย เท่ากับ จำนวนต้นที่ระบาคต่อไร่ ต่ำกว่า 50%

ผลกระทบจากการระบายน้ำที่ 2



อายุ 8 เดือน

ในพื้นที่ ที่มีการระบายน้ำ
ผลผลิตที่ได้รับ ต่ำมาก



อายุ 6 เดือน

สถานการณ์การระบาด ที่ อำเภอบรรพตพิสัย ในปัจจุบัน







หัวมันอายุ 7 เดือน



การระบาดที่ อำเภอด่านขุนทด







มันที่ปล่อยข้ามปี เป็นแหล่งแพร่กระจายของเพลี้ยแป้ง





**รายงานการพบเพลี้ยแป้งบนลำปะหลัง
ทำลายต้นสะเดาข้าง หลังจากฉีดพ่นสารเคมีกำจัด
ในไร่มันสำปะหลัง**



มดเป็นพาหะสำคัญในการย้ายเพลี้ยแป้ง





