

เพลี้ยแป้งสีชมพูระบาด อย่าฉีดยาฆ่าแมลง

การระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูในไร่มันสำปะหลัง ในหลายพื้นที่ ซึ่งนักวิชาการประเมินว่าเกิดจากอากาศที่ร้อนและแล้งในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ทำให้เพลี้ยแป้งสีชมพูเพิ่มปริมาณได้รวดเร็วขึ้น



แต่การระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูในขณะนี้ ไม่น่าจะรุนแรงเหมือนการระบาดในปี 2553 - 2555 เนื่องจากมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง แห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร และ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กระจายแตนเบียนไป ทั่วประเทศ ทำให้การระบาดลดลง ตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นมา



สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระรัตนราชสุมาลัย
สยามบรมราชกุมารี

เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 2/2558

อย่างไรก็ตามบางครั้งสภาพอากาศที่แล้งและ ร้อน จะทำให้การระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูกลับ มาระบาดได้เป็นหย่อมๆ ทางนักวิชาการได้แนะนำ ว่า “อย่าฉีดยาฆ่าแมลง” เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง สีชมพู อย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้แมลงศัตรู ธรรมชาติที่เป็นประโยชน์คือ แตนเบียน (*Anagerus lopezi*) และแมลงช้างปีกใส (*Plesiochysa ramburi*) ที่ช่วยกำจัดเพลี้ยแป้งสีชมพูถูกทำลาย ด้วย อาจส่งผลให้การระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู รุนแรงมากขึ้น

