



# เพลี้ยแป้ง




## วายร้ายทำลายมันสำปะหลัง



เพลี้ยแป้ง



เพลี้ยแป้งระบาด



แช่ท่อนพันธุ์

### ป้องกันเพลี้ยแป้ง ก่อนเกิดปัญหา

- ป้องกัน 1** ทำแปลงให้สะอาด โดยเก็บเศษซากต้นมันออก และไถแปลงตากดินไว้อย่างน้อย 14 วัน ก่อนปลูก
- ป้องกัน 2** เลือกท่อนพันธุ์จากแปลงที่ปราศจากเพลี้ยแป้ง
- ป้องกัน 3** แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารไทอะมีโทแซม 25% WG โดยใช้อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร นาน 10 นาที ซึ่งจะป้องกันเพลี้ยแป้งได้ 24 วันหลังปลูก
- ป้องกัน 4** หมั่นตรวจแปลงปลูกทุกสัปดาห์ หากพบเพลี้ยแป้งให้รีบกำจัดทันที

### เพลี้ยแป้งร้าย ทำลายมัน ต้องร่วมกันกำจัดให้สิ้น

#### ระบาดเล็กน้อย

ให้เด็ดยอด นำไปทำลาย และใช้เชื้อราบิวเวอเรีย ฉีดพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ในบริเวณที่ระบาด

#### ระบาดรุนแรง

##### มันยังไม่หุ้มยอด

- \* ในพื้นที่ระบาด 1 ไร่ ให้ใช้สารไทอะมีโทแซม 25% WG 8 กรัม ผสมกับไวท์ออยล์ 67% EC 200 ซีซี ผสมกับน้ำ 80 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว
- \* ให้ฉีดพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน

##### มันหุ้มยอด

- \* **ถ้ามันยังเล็ก** ให้ถอนต้นทั้งหมดนำไปทำลาย
- \* **ถ้ามันสร้างหัวแล้ว สามารถเก็บเกี่ยวได้** ให้รีบเก็บเกี่ยวทันที นำต้นทั้งหมดไปทำลาย ทำความสะอาดแปลง โดยไถพลิกแปลงตากดินไว้ 14 วัน ก่อนปลูกใหม่



เชื้อราบิวเวอเรีย



ระบาดรุนแรง



ฉีดพ่นกำจัดเพลี้ยแป้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โทร. 02-679-9112-6  
ห้วยบง โทร. 044-249-770, 081-925-0374



TTDI

